

LE THÉORÈME CENTRAL LIMITÉ

OLIVIER CASTÉRA

RÉSUMÉ. Le théorème central limite établit que la loi normale apparaît chaque fois que la grandeur aléatoire observée peut être présentée comme la somme d'un nombre suffisamment grand de composantes élémentaires indépendantes ou faiblement liées, dont chacune influe peu sur la somme.

TABLE DES MATIÈRES

1 Variable aléatoire. Espérance. Moments. Variance.	1
2 Inégalité de Bienaymé-Tchébychev	3
3 Fonctions de variables aléatoires	4
3.1 Somme de deux variables aléatoires	5
3.2 Produit de deux variables aléatoires	7
4 Théorème central limite	8
4.1 Fonction caractéristique	8
4.2 Fonction caractéristique de la loi normale	9
4.3 Somme de deux lois normales	10
4.4 Théorème central limite	10
5 Les lois des grands nombres	12
5.1 Théorème de Tchébychev	12
5.2 Théorème de Tchébychev généralisé	13
5.3 Théorème de Markov	14

1 VARIABLE ALÉATOIRE. ESPÉRANCE. MOMENTS. VARIANCE.

Définition 1.1. On appelle variable aléatoire discrète X , une fonction qui associe à chaque résultat d'une expérience, une valeur x_i inconnue d'avance, parmi un ensemble de valeurs possibles x_1, \dots, x_n .

Définition 1.2. On appelle variable aléatoire continue X , une fonction qui associe à chaque résultat d'une expérience, une valeur x inconnue d'avance, sur un ensemble fini ou non de valeurs possibles $[a, b]$.

Définition 1.3. On appelle espérance mathématique ou valeur moyenne de la variable aléatoire discrète X , la somme des produits de toutes les valeurs x_i possibles de cette variable par les probabilités p_i de ces valeurs. On la note $E[X]$ ou $M[X]$ ou m_x ou encore \bar{x} . On a

$$E[X] \triangleq \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

Dans le cas d'une variable aléatoire continue X , on a

$$E[X] \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

Définition 1.4. On appelle moment initial d'ordre s d'une variable aléatoire discrète X , la fonction $\alpha_s[X]$ définie par

$$\alpha_s[X] \triangleq \sum_{i=1}^n x_i^s \mathcal{P}_i$$

Initial signifiant que le moment est calculé par rapport à l'origine des coordonnées. Dans le cas d'une variable aléatoire continue X , on a

$$\alpha_s[X] \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} x^s f(x) dx$$

Par conséquent le moment d'ordre un, $\alpha_1[X]$, se confond avec l'espérance mathématique $E[X]$ de la variable aléatoire X

$$\alpha_1[X] \triangleq E[X]$$

Les moments permettent de caractériser la loi de probabilité \mathcal{P} , en donnant sa position, son degré de dispersion, et sa forme.

Définition 1.5. On appelle variable aléatoire centrée associée à X , et l'on note \mathring{X} , la différence

$$\mathring{X} \triangleq X - E[X]$$

Définition 1.6. On appelle moment centré d'ordre s d'une variable aléatoire discrète X , la fonction $\mu_s[X]$ définie par

$$\mu_s[X] \triangleq \sum_{i=1}^n (x_i - m_x)^s \mathcal{P}_i$$

Dans le cas d'une variable aléatoire continue X , on a

$$\mu_s[X] \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} (x - m_x)^s f(x) dx$$

Théorème 1.1. Pour toute variable aléatoire, le moment centré d'ordre un est nul.

Démonstration.

$$\begin{aligned} E[\mathring{X}] &= E[X - E[X]] \\ &= E[X] - E[X] \\ &= 0 \end{aligned}$$

□

Définition 1.7. On appelle variance de la variable aléatoire discrète X , son moment centré d'ordre deux. On la note $V[X]$ ou V_x ou $D[X]$ ou D_x .

$$V[X] \triangleq \sum_{i=0}^n \dot{x}_i^2 \mathcal{P}_i$$

Dans le cas d'une variable aléatoire continue X , on a

$$V[X] \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} \dot{x}_i^2 f(x) dx$$

De part sa définition, la variance est l'espérance mathématique du carré de la variable aléatoire centrée associée à X .

$$V[X] \triangleq E[\dot{X}^2]$$

2 INÉGALITÉ DE BIENAYMÉ-TCHÉBYCHEV

Théorème 2.1. Soit X une variable aléatoire d'espérance mathématique $E[X]$ et de variance $V[X]$. Pour tout réel positif α , la probabilité pour que X s'éloigne de son espérance mathématique d'une grandeur supérieure ou égale à α , a pour limite supérieure $V[X]/\alpha^2$:

$$P(|X - E[X]| \geq \alpha) \leq \frac{V[X]}{\alpha^2}$$

Démonstration. Effectuons d'abord la démonstration pour une variable aléatoire discrète, X , dont la suite de répartition est donnée par :

$$\begin{array}{cccccc} x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ \hline p_1 & p_2 & p_3 & \dots & p_n \end{array}$$

où $p_i = P(X = x_i)$ est la probabilité pour que la variable aléatoire X prenne la valeur x_i . Soit α un réel positif,

$$P(|X - E[X]| \geq \alpha) = \sum_{|x_i - E[X]| \geq \alpha} p_i$$

Or,

$$\begin{aligned} V[X] &= \sum_{i=1}^n (x_i - E[X])^2 p_i \\ &= \sum_{i=1}^n |x_i - E[X]|^2 p_i \end{aligned}$$

Les termes de la somme étant positifs ou nuls, on a

$$V[X] \geq \sum_{|x_i - E[X]| \geq \alpha} |x_i - E[X]|^2 p_i$$

et puisque $|x_i - E[X]| \geq \alpha$, on a

$$\begin{aligned} V[X] &\geq \sum_{|x_i - E[X]| \geq \alpha} \alpha^2 p_i \\ \sum_{|x_i - E[X]| \geq \alpha} p_i &\leq \frac{V[X]}{\alpha^2} \\ P(|x - E[X]| \geq \alpha) &\leq \frac{V[X]}{\alpha^2} \end{aligned}$$

□

Démonstration. Dans le cas où X est continue, on note $f(x)$ la densité de probabilité de X :

$$P(|X - E[X]| \geq \alpha) = \int_{|x_i - E[X]| \geq \alpha} f(x) dx$$

Or,

$$\begin{aligned} V[X] &= \int_{-\infty}^{+\infty} (x_i - E[X])^2 f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} |x_i - E[X]|^2 f(x) dx \end{aligned}$$

Les termes de l'intégrale étant positifs ou nuls, on a

$$V[X] \geq \int_{|x_i - E[X]| \geq \alpha} |x_i - E[X]|^2 f(x) dx$$

et puisque $|x_i - E[X]| \geq \alpha$, on a

$$\begin{aligned} V[X] &\geq \int_{|x_i - E[X]| \geq \alpha} \alpha^2 f(x) dx \\ \int_{|x_i - E[X]| \geq \alpha} f(x) dx &\leq \frac{V[X]}{\alpha^2} \\ P(|X - E[X]| \geq \alpha) &\leq \frac{V[X]}{\alpha^2} \end{aligned} \quad \square$$

3 FONCTIONS DE VARIABLES ALÉATOIRES

Soit X une variable aléatoire discrète de tableau de répartition suivant

$$\begin{array}{cccccc} x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ \hline p_1 & p_2 & p_3 & \dots & p_n \end{array}$$

Soit Z une fonction de la variable aléatoire X

$$Z = \varphi(X)$$

son tableau de répartition est alors le suivant

$$\begin{array}{cccccc} \varphi(x_1) & \varphi(x_2) & \varphi(x_3) & \dots & \varphi(x_n) \\ \hline p_1 & p_2 & p_3 & \dots & p_n \end{array}$$

Son espérance mathématique $E[Z]$ est donnée par

$$\begin{aligned} E[Z] &= E[\varphi(X)] \\ &= \sum_{i=1}^n \varphi(x_i) p_i \end{aligned}$$

Lorsque la variable aléatoire X est continue, on a

$$E[Z] = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) f(x) dx$$

Lorsque Z est une fonction de deux variables aléatoires, X et Y

$$Z = \varphi(X, Y)$$

son tableau de répartition est le suivant

$\varphi(x_1, y_1)$	$\varphi(x_1, y_2)$	$\varphi(x_1, y_3)$	\dots	$\varphi(x_1, y_n)$
p_{11}	p_{12}	p_{13}	\dots	p_{1n}
$\varphi(x_2, y_1)$	$\varphi(x_2, y_2)$	$\varphi(x_2, y_3)$	\dots	$\varphi(x_2, y_n)$
p_{21}	p_{22}	p_{23}	\dots	p_{2n}
$\varphi(x_3, y_1)$	$\varphi(x_3, y_2)$	$\varphi(x_3, y_3)$	\dots	$\varphi(x_3, y_n)$
p_{31}	p_{32}	p_{33}	\dots	p_{3n}
\dots				
$\varphi(x_n, y_1)$	$\varphi(x_n, y_2)$	$\varphi(x_n, y_3)$	\dots	$\varphi(x_n, y_n)$
p_{n1}	p_{n2}	p_{n3}	\dots	p_{nn}

où $p_{ij} = P[(X = x_i)(Y = y_j)]$ est la probabilité pour que le système (X, Y) prenne la valeur (x_i, y_j) . Son espérance mathématique $E[Z]$ est donnée par

$$\begin{aligned} E[Z] &= E[\varphi(X, Y)] \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \varphi(x_i, y_j) p_{ij} \end{aligned} \tag{1}$$

Lorsque les variables aléatoires X et Y sont continues, on a

$$E[Z] = \iint_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x, y) f(x, y) dx dy \tag{2}$$

3.1 Somme de deux variables aléatoires

Théorème 3.1. *L'espérance mathématique d'une somme de deux variables aléatoires est égale à la somme de leurs espérances mathématiques.*

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y]$$

Démonstration. Soient X et Y deux variables aléatoires discrètes. Avec l'équation (1) on a

$$\begin{aligned} E[X + Y] &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (x_i + y_j) p_{ij} \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i p_{ij} + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n y_j p_{ij} \\ &= \sum_{i=1}^n \left(x_i \sum_{j=1}^n p_{ij} \right) + \sum_{j=1}^n \left(y_j \sum_{i=1}^n p_{ij} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n x_i p_i + \sum_{j=1}^n y_j p_j \\ &= E[X] + E[Y] \end{aligned}$$

□

Démonstration. Soient maintenant X et Y deux variables continues. Avec l'équation (2) on a

$$\begin{aligned}
 E[X + Y] &= \iint_{-\infty}^{+\infty} (x + y)f(x, y)dxdy \\
 &= \iint_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y)dxdy + \iint_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y)dxdy \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} x \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy \right) dx + \int_{-\infty}^{+\infty} y \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx \right) dy \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf_1(x)dx + \int_{-\infty}^{+\infty} yf_2(y)dy \\
 &= E[X] + E[Y]
 \end{aligned}$$

□

Définition 3.1. On appelle covariance des variables aléatoires X et Y , l'espérance mathématique du produit des deux variables aléatoires centrées \mathring{X} et \mathring{Y} associées à X et Y . Elle se note K_{xy}

$$K_{xy} \triangleq E[\mathring{X}\mathring{Y}]$$

Théorème 3.2. La variance de la somme de deux variables aléatoires est égale à la somme de leurs variances à laquelle s'ajoute la double covariance.

$$V[X + Y] = V[X] + V[Y] + 2K_{xy}$$

Démonstration. Soit la variable aléatoire Z telle que

$$Z = X + Y$$

En utilisant le théorème 3.1, on a

$$\begin{aligned}
 E[Z] &= E[X + Y] \\
 &= E[X] + E[Y]
 \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}
 Z - E[Z] &= X - E[X] + Y - E[Y] \\
 \mathring{Z} &= \mathring{X} + \mathring{Y}
 \end{aligned}$$

Par définition de la variance

$$\begin{aligned}
 V[Z] &= E[\mathring{Z}^2] \\
 &= E[(\mathring{X} + \mathring{Y})^2] \\
 &= E[\mathring{X}^2 + \mathring{Y}^2 + 2\mathring{X}\mathring{Y}] \\
 &= E[\mathring{X}^2] + E[\mathring{Y}^2] + 2E[\mathring{X}\mathring{Y}] \\
 &= V[X] + V[Y] + 2K_{xy}
 \end{aligned}$$

□

Définition 3.2. Les variables aléatoires X et Y sont dites indépendantes si la loi de répartition de chacune d'elles ne dépend pas des valeurs prises par l'autre.

La probabilité d'un système de variables aléatoires discrètes indépendantes est égale au produit des probabilités des variables du système

$$\begin{aligned} P_{ij} &= P[(X = x_i)(Y = y_j)] \\ &= P[(X = x_i)]P[(Y = y_j)] \\ &= P_i P_j \end{aligned}$$

La densité de probabilité d'un système de variables aléatoires continues indépendantes est égale au produit des densités des variables du système

$$f(x, y) = f_1(x)f_2(y)$$

Théorème 3.3. La covariance K_{xy} de variables aléatoires X et Y indépendantes est nulle.

Démonstration. Considérons des variables aléatoires discrètes

$$K_{xy} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (x_i - m_x)(y_j - m_y)P_{ij}$$

d'après la définition (3.2) des variables indépendantes

$$P_{ij} = P_i P_j$$

Donc,

$$K_{xy} = \sum_{i=1}^n (x_i - m_x) P_i \sum_{j=1}^n (y_j - m_y) P_j$$

Ces sommes sont respectivement le moment centré d'ordre un de X et de Y , elles sont nulles d'après le théorème 1.1, et

$$K_{xy} = 0$$

□

Démonstration. Considérons maintenant des variables aléatoires continues

$$K_{xy} = \iint_{-\infty}^{+\infty} (x - m_x)(y - m_y) f(x, y) dx dy$$

d'après la définition (3.2) des variables indépendantes

$$f(x, y) = f_1(x)f_2(y)$$

Donc,

$$K_{xy} = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - m_x) f_1(x) dx \int_{-\infty}^{+\infty} (y - m_y) f_2(y) dy$$

Ces intégrales sont respectivement le moment centré d'ordre un de X et de Y , elles sont nulles d'après le théorème 1.1, et

$$K_{xy} = 0$$

□

3.2 Produit de deux variables aléatoires

Théorème 3.4. L'espérance mathématique du produit de deux variables aléatoires X et Y est égale au produit de leurs espérances mathématiques plus la covariance

$$E[XY] = E[X]E[Y] + K_{xy}$$

Démonstration. D'après la définition (3.1) de la covariance

$$\begin{aligned}
 K_{xy} &= E[\dot{X}\dot{Y}] \\
 &= E[(X - E[X])(Y - E[Y])] \\
 &= E[XY - XE[Y] - E[X]Y + E[X]E[Y]] \\
 &= E[XY] - E[XE[Y]] - E[E[X]Y] + E[E[X]E[Y]] \\
 &= E[XY] - E[X]E[Y] - E[X]E[Y] + E[X]E[Y] \\
 &= E[XY] - E[X]E[Y]
 \end{aligned}$$

□

4 THÉORÈME CENTRAL LIMITÉ

4.1 Fonction caractéristique

Définition 4.1. On appelle fonction caractéristique de la variable aléatoire discrète X , l'espérance mathématique de la fonction $\exp(itX)$

$$\begin{aligned}
 g(t) &= \sum_{k=1}^n e^{itx_k} p_k \\
 &= E[e^{itX}]
 \end{aligned}$$

On appelle fonction caractéristique de la variable aléatoire continue X , la transformation de Fourier de sa densité de probabilité $f(x)$

$$\begin{aligned}
 g(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} f(x) dx \\
 &= E[e^{itX}]
 \end{aligned}$$

Théorème 4.1. Si deux variables aléatoires X et Y sont liées par la relation

$$Y = aX$$

où a est un facteur non aléatoire, leurs fonctions caractéristiques sont liées par la relation

$$g_y(t) = g_x(at)$$

Démonstration.

$$\begin{aligned}
 g_y(t) &= E[e^{itY}] \\
 &= E[e^{itaX}] \\
 &= E[e^{i(at)X}] \\
 &= g_x(at)
 \end{aligned}$$

□

Théorème 4.2. La fonction caractéristique d'une somme de variables aléatoires indépendantes est égale au produit des fonctions caractéristiques des composantes.

Démonstration. Soient X_1, X_2, \dots, X_n , des variables aléatoires indépendantes de fonctions caractéristiques $g_{x_1}, g_{x_2}, \dots, g_{x_n}$, et de somme

$$Y = \sum_{k=1}^n X_k$$

La fonction caractéristique de Y s'écrit

$$\begin{aligned} g_y(t) &= E[e^{itY}] \\ &= E[e^{it\sum_{k=1}^n X_k}] \\ &= E\left[\prod_{k=1}^n e^{itX_k}\right] \end{aligned}$$

Les variables aléatoires X_k étant indépendantes, les fonctions e^{itX_k} le sont également et l'on peut utiliser le théorème 3.4

$$\begin{aligned} g_y(t) &= \prod_{k=1}^n E[e^{itX_k}] \\ &= \prod_{k=1}^n g_{x_k}(t) \end{aligned} \quad \square$$

4.2 Fonction caractéristique de la loi normale

Théorème 4.3. La fonction caractéristique de la loi normale d'espérance mathématique m_x nulle et de variance σ^2 s'écrit

$$g(t) = e^{-t^2\sigma^2/2}$$

Démonstration. Soit une variable aléatoire continue X répartie suivant la loi normale, d'espérance mathématique m_x nulle, et de variance σ^2 . Sa densité de probabilité $f(x)$ s'écrit

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/(2\sigma^2)}$$

Sa fonction caractéristique s'écrit

$$\begin{aligned} g(t) &= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} e^{-x^2/(2\sigma^2)} dx \\ &= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx - x^2/(2\sigma^2)} dx \end{aligned}$$

On utilise la formule suivante

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-Ax^2 \pm 2Bx - C} dx = \sqrt{\frac{\pi}{A}} e^{-(AC-B^2)/A}$$

On identifie : $A = 1/(2\sigma^2)$, $B = it/2$, et $C = 0$. D'où

$$\begin{aligned} g(t) &= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \sqrt{2\pi\sigma^2} e^{-(t^2/4)2\sigma^2} \\ &= e^{-t^2\sigma^2/2} \end{aligned} \quad \square$$

4.3 Somme de deux lois normales

Théorème 4.4. *La somme de deux lois normales est une loi normale.*

Démonstration. Soient X et Y deux variables aléatoires continues indépendantes dont les densités de probabilité se répartissent selon des lois normales

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{\sigma_x \sqrt{2\pi}} e^{-x^2/(2\sigma_x^2)} \\ f(y) &= \frac{1}{\sigma_y \sqrt{2\pi}} e^{-y^2/(2\sigma_y^2)} \end{aligned}$$

D'après la définition 4.1, leurs fonctions caractéristiques s'écrivent

$$\begin{aligned} g_x(t) &= e^{-t^2\sigma_x^2/2} \\ g_y(t) &= e^{-t^2\sigma_y^2/2} \end{aligned}$$

D'après le théorème 4.2, la fonction caractéristique $g_z(t)$ de leur somme est égale au produit des fonctions caractéristiques

$$\begin{aligned} g_z(t) &= g_x(t) \times g_y(t) \\ &= e^{-t^2\sigma_x^2/2} \times e^{-t^2\sigma_y^2/2} \\ &= e^{-t^2(\sigma_x^2 + \sigma_y^2)/2} \end{aligned}$$

qui, d'après le théorème 4.3, est la fonction caractéristique d'une loi normale d'espérance mathématique m_z nulle et de variance $\sigma_z^2 = \sigma_x^2 + \sigma_y^2$. \square

4.4 Théorème central limite

Théorème 4.5. *Soient X_1, X_2, \dots, X_n , des variables aléatoires indépendantes de même loi de répartition, d'espérance mathématique m_x et de variance σ^2 . Lorsque n augmente indéfiniment la loi de répartition de la somme*

$$Y_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n X_k$$

tend vers la loi normale.

Démonstration. Notez bien que le facteur $1/\sqrt{n}$ est nécessaire pour la démonstration, mais que la convergence de Y_n vers la loi normale entraîne celle de la somme des variables aléatoires $\sum_{k=1}^n X_k$. Nous allons utiliser les fonctions caractéristiques et nous admettrons sans démonstration que la convergence des fonctions caractéristiques entraîne celle des lois. D'après le théorème 4.1, la fonction caractéristique de Y_n est égale à

$$\begin{aligned} g_{y_n}(t) &= g_{1/\sqrt{n} \sum_{k=1}^n X_k} \\ &= g_{\sum_{k=1}^n X_k} \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right) \end{aligned}$$

D'après le théorème 4.2, la fonction caractéristique de Y_n est égale au produit des fonctions caractéristiques des X_k

$$g_{y_n}(t) = \left[g_x \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right) \right]^n \quad (3)$$

La fonction caractéristique de chaque X_k s'écrit

$$g_x\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ixt/\sqrt{n}} f(x) dx$$

Effectuons un développement limité au voisinage de zéro, à l'ordre 3

$$\begin{aligned} g_x\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) &= g_x(0) + g'_x(0) \left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) + \left[\frac{g''_x(0)}{2} + o\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right] \frac{t^2}{n} \\ \text{où } \lim_{t/\sqrt{n} \rightarrow 0} o\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) &= 0 \end{aligned} \quad (4)$$

Calculons chacun des termes

$$\begin{aligned} g_x(0) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx \\ &= 1 \end{aligned}$$

En dérivant on a

$$\begin{aligned} g'_x\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) &= \int_{-\infty}^{+\infty} ixe^{ixt/\sqrt{n}} f(x) dx \\ &= i \int_{-\infty}^{+\infty} xe^{ixt/\sqrt{n}} f(x) dx \end{aligned}$$

en posant $t/\sqrt{n} = 0$ on a

$$\begin{aligned} g'_x(0) &= i \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx \\ &= im_x \end{aligned}$$

On ne restreint pas la généralité en transférant l'origine au point m_x , on a alors $m_x = 0$, et

$$g'_x(0) = 0$$

En dérivant une deuxième fois

$$g''_x\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) = - \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{ixt/\sqrt{n}} f(x) dx$$

en posant $t/\sqrt{n} = 0$

$$g''_x(0) = - \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx$$

et comme on a posé $E[X] = 0$, d'après la définition 1.7 l'expression précédente n'est rien d'autre que l'opposée de la variance

$$g''_x(0) = -\sigma^2$$

En substituant ces résultats dans l'équation (4), lorsque $t/\sqrt{n} \rightarrow 0$

$$g_x\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \left[\frac{\sigma^2}{2} - o\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right] \frac{t^2}{n}$$

puis dans l'équation (3)

$$g_{y_n}(t) = \left\{ 1 - \left[\frac{\sigma^2}{2} - o\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) \right] \frac{t^2}{n} \right\}^n$$

Prenons le logarithme de cette expression

$$\ln g_{y_n}(t) = n \ln \left\{ 1 - \left[\frac{\sigma^2}{2} - o\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) \right] \frac{t^2}{n} \right\}$$

On pose

$$\chi = \left[\frac{\sigma^2}{2} - o\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) \right] \frac{t^2}{n}$$

et l'on a

$$\ln g_{y_n}(t) = n \ln \{1 - \chi\}$$

Lorsque n tend vers l'infini, χ tend vers 0, et $\ln(1 - \chi)$ tend vers $-\chi$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln g_{y_n}(t) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n(-\chi) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \left[-\frac{\sigma^2}{2} + o\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) \right] \frac{t^2}{n} \\ &= -\frac{t^2 \sigma^2}{2} + \lim_{n \rightarrow +\infty} t^2 o\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) \end{aligned}$$

Or $\lim_{t/\sqrt{n} \rightarrow 0} o(t) = 0$, donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} o\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) = 0$$

donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln g_{y_n}(t) = -\frac{t^2 \sigma^2}{2}$$

d'où

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} g_{y_n}(t) = e^{-t^2 \sigma^2 / 2}$$

qui, d'après le théorème 4.3, est la fonction caractéristique de la loi normale d'espérance mathématique nulle, et de variance σ^2 . \square

5 LES LOIS DES GRANDS NOMBRES

Les lois des grands nombres affirment la convergence en probabilité des variables aléatoires vers des grandeurs constantes, lorsque le nombre d'expériences augmente indéfiniment.

5.1 Théorème de Tchébychev

Soit une variable aléatoire X , fournissant lors de n expériences indépendantes, les valeurs x_1, x_2, \dots, x_n . Afin d'utiliser le théorème 3.1, nous allons considérer que ces valeurs sont les résultats d'une unique expérience réalisée sur chacune des n variables aléatoires indépendantes X_1, X_2, \dots, X_n , de même loi de répartition que la variable aléatoire X .

Plutôt que de considérer la somme de ces variables aléatoires, nous considérerons la moyenne arithmétique de ces variables, autrement dit la somme divisée par n . Soit donc la variable aléatoire Y définie comme la moyenne arithmétique de ces n variables aléatoires

$$Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Son espérance mathématique s'écrit

$$\begin{aligned} E[Y] &= E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right] \\ &= \frac{1}{n} E\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] \end{aligned}$$

Avec le théorème 3.1 on a

$$\begin{aligned} E[Y] &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i] \\ &= \frac{1}{n} n E[X] \\ &= E[X] \end{aligned}$$

La variance de Y s'écrit

$$\begin{aligned} V[Y] &= E[\dot{Y}^2] \\ &= E\left[\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \dot{X}_i\right)^2\right] \\ &= \frac{1}{n^2} E\left[\left(\sum_{i=1}^n \dot{X}_i\right)^2\right] \\ &= \frac{1}{n^2} V\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] \end{aligned}$$

Avec le théorème 3.2 et le théorème 3.3 on a

$$\begin{aligned} V[Y] &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n V[X_i] \\ &= \frac{1}{n} V[X] \end{aligned}$$

Théorème 5.1. Pour un nombre d'expériences suffisamment grand, la moyenne arithmétique des valeurs observées d'une variable aléatoire converge en probabilité vers son espérance mathématique

$$\forall \delta > 0, \forall \varepsilon > 0, \exists n \text{ tel que } P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - E[X]\right| \geq \varepsilon\right) < \delta$$

Démonstration. Appliquons à Y l'inégalité de Bienaymé-Tchébychev en posant $\alpha = \varepsilon$

$$P(|Y - E[Y]| \geq \varepsilon) \leq \frac{V[Y]}{\varepsilon^2}$$

En appliquant les résultats trouvés précédemment sur l'espérance et la variance de Y

$$P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - E[X]\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{V[X]}{n \varepsilon^2}$$

et l'on pose $\delta = V[X]/(n \varepsilon^2)$. Nous pouvons toujours choisir n suffisamment grand pour avoir l'inégalité ci-dessus, aussi petit que soit ε . \square

5.2 Théorème de Tchébychev généralisé

On peut généraliser la loi des grands nombres au cas de variables aléatoires de loi de répartition différentes.

Théorème 5.2. Soient n variables aléatoires indépendantes X_1, X_2, \dots, X_n , de lois de répartition différentes, d'espérances mathématiques $E[X_1], E[X_2], \dots, E[X_n]$, et de variances $V[X_1], V[X_2], \dots, V[X_n]$. Si toutes les variances ont même limite supérieure L

$$\forall i, V[X_i] < L$$

pour un nombre d'expériences suffisamment grand, la moyenne arithmétique des valeurs observées des variables aléatoires X_1, X_2, \dots, X_n , converge en probabilité vers la moyenne arithmétique de leurs espérances mathématiques

$$\forall \delta > 0, \forall \varepsilon > 0, \exists n \text{ tel que } P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i]\right| \geq \varepsilon\right) < \delta$$

Démonstration. Soit la variable aléatoire Y telle que

$$Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Appliquons à Y l'inégalité de Tchébychev :

$$\begin{aligned} \forall \delta > 0, \forall \varepsilon > 0, \exists n \text{ tel que } P(|Y - E[Y]| \geq \varepsilon) &< \frac{V[Y]}{\varepsilon^2} \\ P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i]\right| \geq \varepsilon\right) &< \frac{\sum_{i=1}^n V[X_i]}{n^2 \varepsilon^2} \\ P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i]\right| \geq \varepsilon\right) &< \frac{L}{n \varepsilon^2} \end{aligned}$$

et l'on pose $\delta = L/(n\varepsilon^2)$. Nous pouvons toujours choisir n suffisamment grand pour avoir l'inégalité ci-dessus, aussi petit que soit ε . \square

5.3 Théorème de Markov

On peut généraliser la loi des grands nombres au cas des variables aléatoires dépendantes.

Théorème 5.3. Théorème de Markov

Soient n variables aléatoires dépendantes X_1, X_2, \dots, X_n , de lois de répartition différentes, d'espérances mathématiques $E[X_1], E[X_2], \dots, E[X_n]$, et de variances $V[X_1], V[X_2], \dots, V[X_n]$. Si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n V[X_i] = 0$$

la moyenne arithmétique des valeurs observées des variables aléatoires X_1, X_2, \dots, X_n , converge en probabilité vers la moyenne arithmétique de leurs espérances mathématiques

$$\forall \delta > 0, \forall \varepsilon > 0, \exists n \text{ tel que } P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i]\right| \geq \varepsilon\right) < \delta$$

Démonstration. Soit la variable aléatoire Y telle que

$$Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Appliquons à Y l'inégalité de Tchébychev :

$$\forall \delta > 0, \forall \varepsilon > 0, \exists n \text{ tel que } P(|Y - E[Y]| \geq \varepsilon) < \frac{V[Y]}{\varepsilon^2}$$

$$P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i]\right| \geq \varepsilon\right) < \frac{\sum_{i=1}^n V[X_i]}{n^2 \varepsilon^2}$$

On pose $\delta = \frac{1}{n^2 \varepsilon^2} \sum_{i=1}^n V[X_i]$. Par hypothèse, on peut toujours choisir n suffisamment grand pour avoir $\lim_{n \rightarrow \infty} \delta = 0$, aussi petit soit ε . \square

Adresse électronique : o.castera@free.fr

Site web : <https://sciences-physiques.neocities.org>